

والثاليل التاليلية معدية للغاية، ونحو ثلثي الأشخاص الذين يمارسون الجنس مع أشخاص مصابين بالثاليل يقومون بتطویرها في غضون ثلاثة أشهر.

فالتنفس للمرأة تظهر الثاليل التاليلية خارج أو داخل المهبل أو على عنق الرحم أو حول فتحة الشرج، أما في الرجل فالثاليل التاليلية أقل شيوعاً، ولكنها تظهر على كيس الصفن أو حول فتحة الشرج وعلى حشفة القضيب.

ونادراً ما تظهر الثاليل على الفم والحلق بالنسبة للشخص الذي يمارس الجنس عن طريق الفم مع شخص مصاب بالعدوى.

وغالباً ما تظهر الثاليل التاليلية في مجموعات، ويمكن أن تكون صفيرة جداً أو تمتد إلى أعداد كبيرة، غالباً ما تخفي إذا تركت دون علاج.

فليس هناك سبيل إلى التنبؤ بما إذا كانت الثاليل سوف تنمو أو تخفي، وإذا كنت تشك أن لديك الثاليل التاليلية، فعليك أن تقوم بالمتابعة مع الطبيب.

**الوقاية:**

ينبغي على الأشخاص التوقف عن ممارسة الأفعال الجنسية إذا كانوا يعتقدون أنهم مصابون بالثاليل، والتماس العلاج على الفور لتجنب انتشارها.

بيد أن الأعراض ليست دائماً واضحة، كما أن الباقي الذكري يوفر بعض الحماية من هذه الأمراض المنقوله بالاتصال الجنسي، ولكنها ليست بالحماية الكاملة.

وهناك لقاح جديد يدعى Gardasil ويعمل على منع عدو فيروس الورم الحليمي البشري، وقد أمر مركز السيطرة على الأمراض بأن يعطي هذا اللقاح بشكل روتيني للبنات في سن ١١ إلى ١٢.

أما اللجنة الوطنية الاستشارية لممارسات التحصين فتوصي بمنح Gardasil للبنات في سن ٩ سنوات (تحت إشراف الطبيب) والشابات حتى سن الـ ٢٦.

العلاج	التشخيص	الأعراض	كيف تحدث عدوى البشري والثاليل التاليلية؟
الإزالة عن طريق التجميد العلاج بالليزر، الكريمات الموضعية، حقن الأدوية المضادة للفيروسات.	فحوصات الأعضاء التاليلية، والتحليل المجهري لعينات الأنسجة، الاختبارات المهمبية.	- ظهور الثاليل الخام والمسطحة وأحياناً العنقدية. - تهيج وحرقة وحكة. - رائحة كريهة. - آلام أثناء الجماع. - زيادة الإفرازات المهمبية.	تحدث عن طريق الاتصال الجنسي مع الشخص المصابة.

**٤- الزهري:** Syphilis

إن مرض الزهري الآن يمكن علاجه بسهولة وفعالية، والمشكلة هي أن الكثير من الناس لا تدرك أعراضه المبكرة ولا يبحثون عن العلاج، ويزداد القلق نحو الزهري لخطورته في الانتقال واكتساب الفيروس الذي يسبب مرض الإيدز.

والزهري يتسبب في ظهور القرحة المسمى بـ Chancre، والتي تتمركز في نقطة يمكن من خلالها أن تتسلى إلى الجسم، والقرحة تستمر من أسبوع إلى خمسة أسابيع ثم تزول من تلقاء نفسها، تاركة بعض الناس في وهم أنهم قد شفوا منها ولكن هذا خطأ.

فالمرض لم يختفه بل يتقدم إلى المرحلة الثانية والتي تتميز بالطفح الجلدي والبقع والثاليل أو بقع بيضاء على أجزاء مختلفة من الجسم، ولذلك فإن المرحلة الثانية أيضاً يمكن أن تتفدم مع حمى والتهاب في العلق والمصداع ومن الصعب أحياناً التفريق بينه وبين أحد الأمراض الفيروسية مثل الأنفلونزا.

وهذه أيضاً سوف تختفي من تلقاء نفسها، وإذا تركت دون علاج فإن المرض يمكن أن يتقدم دون أعراض ظاهرة مسبباً تلف الأعضاء الداخلية والجهاز العصبي، ولكنه من غير المعروف إذا كان مرض الزهري أشأ فترة العمل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الطفل من عدمه.

**الوقاية:**

عوازل اللاتكس توفر حماية جيدة جداً ضد مرض الزهري، عندما تستخدم بشكل صحيح.

العلاج	التشخيص	الأعراض	كيف تحدث عدوى الكلاميديا؟
المضادات الحيوية.	التجارب المختبرية من الإفرازات التناسلية أو عينة البول.	- انخفاض درجة حرارة الجسم. - آلام أثناء التبول أو الجماع. - التهاب ملتحمة العين. - لاتوجد الإفرازات التناسلية في كثير من الأحيان.	تحدث من خلال عدوى المهبل أو ممارسة الجنس عن طريق الفم أو فتحة الشرج مع شخص مصاب. - تحدث عدوى من خلل الجماع. - الالتهاب ملتحمة العين. - لاتوجد الإفرازات التناسلية في كثير من الأحيان.

**٢- الهرس:**

الهرس يمكن أن يتبع شكلين:

- الأول على شكل تقرحات تظهر على الفم أو الوجه (العقرب الشفوي)، أو فيروس الهرس البسيط من النوع ١.

- والثاني ذلك الذي يظهر على الأعضاء التناسلية (هرس الأعضاء التناسلية، أو فيروس الهرس البسيط من النوع ٢).

وكلا الشكليين ينتشران من خلال الاتصال الجندي، إما بالفم أو الأعضاء التناسلية، وفي كثير من الأحيان بعض الأشخاص الذين لديهم الهرس لا تكون لديهم أعراض، أما البعض الآخر فتظهر لديهم الفروق أو البيولوجيا.

فالهرس مرض مزمن يستمر مدى الحياة، ولكن انتشاره يمكن علاجه بالدواء، وهو أيضاً مرض معد وذلك قبل ظهور البثور ومع الشعور بحكة الجلد، بل وهو من أكثر الأمراض المعدية شيوعاً.

وانتشار الهرس يمكن أن يستمر لمدة أسبوعين ولكن الفيروس لا يزال موجوداً في الجسم، ومن هنا يكون احتمال ظهوره مرة أخرى في أي وقت أمر وارد.

وبالرغم من عدم وجود علاج للهرس على مدى عدة سنوات، إلا أن حالة انتشاره أصبحت أقل، وعادة ما تنتهي كلها تقريباً في غضون خمس أو ست سنوات، ومن ناحية أخرى فإن انتقال الهرس من الأم إلى الطفل أثناء الولادة يمكن أن يكون له عواقب وخيمة.

والمشاكل المحتملة تشمل الإملacs (ولادة الطفل ميتاً)، وانخفاض الوزن عند

الولادة، والعدوى التي تصيب العين، والالتهاب الرئوي، والإنتان (العدوى في مجرى دم الطفل)، وتلف المخ والعين والصمم، والتهاب الكبد الحاد، والتهاب السحايا، ومرض الكبد المزمن وتليف الكبد.

**الوقاية:**

كثيراً ما يعاني الناس من علامات الهرس قبل حتى انتشاره، وتشمل تلك العلامات الوخز أو الحرق، والشعور بالحكمة.

وهذا إشارة إلى تجنب الاتصال الجنسي حتى يتم الشفاء من تلك الأعراض، كما أن الباقي الذكري يمكن أن يساعد في الحد من انتشار الهرس.

العلاج	التشخيص	الأعراض	كيف تحدث عدوى الهرس؟
يتم أخذ سائل من الشفاه منه، المختبر.	يحدث عن طريق تلك الفروج وفحصه في الشخص المصابة، والذي قد تظهر أو لا تظهر عليه الأعراض، بما في ذلك التبديل أو الأنفلونزا.	- آلام البشرة أو الفروج. - الحكة. - بعض الأعراض المشابهة لأعراض الأنفلونزا.	يمكن قمعها أو تخفيف حدتها بتناول الأدوية.

**١- فيروس الورم الحليمي البشري والثاليل التاليلية:**

فيروس الورم الحليمي البشري يعد من أكثر الأمراض الجنسية شيوعاً، ويشير إلى عدم وجود نوع واحد منه، ولكن أكثر من ١٠٠ نوع من الفيروسات.

ووفقاً لما ذكرته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، هناك أكثر من ٢٥ من المائة من النساء في الولايات المتحدة مصابون بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري، ويعتقد أنه السبب في معظم حالات الأصابة بسرطان عنق الرحم فضلاً عن وجود العديد من حالات سرطان الفرج والمهبل.

وبعض فيروسات الورم الحليمي قد يسبب الثاليل التي قد تظهر على القدمين واليدين، أو أجزاء أخرى من الجسم، ويعيش كثير منها في المنطقة التناسلية، وتنتشر عن طريق الاتصال الجنسي.



## الدليل الكامل لمصرفة أكثر

### ١٠ أمراض جنسية شيوعاً

إعداد: سماء هاني

الأمراض الجنسية (STDS)

تعني أن المرض ينتشر عن طريق الاتصال الجنسي، وبصواب بها في الولايات المتحدة وحدها ما يقرب من ١٥ مليون حالة سنوية.

وأفضل طريقة لتجنب تلك الأمراض هي الامتناع عن ممارسة الجنس، أو أن تجري هذه العلاقة مع شريك بعد التأكد من عدم حمله للعدوى.

و فيما يلي أكثر ١٠ أمراض جنسية شيوعاً:

#### ١- مرض الكلاميديا:

ويعرف على أنه من الأمراض الجنسية الصامتة، لأنه في الغالب لا تظهر له أعراض مبكرة، وبصواب به في الولايات المتحدة نحو ٢.٨ مليون شخص سنوياً.

والكلاميديا يمكن أن يسبب العقم لدى الرجال والنساء معاً، كما أن العلاج يمكن أن يتم بواسطة المضادات الحيوية.

#### الوقاية منه:

ينصح العديد من الأطباء بإجراء الاختبار الخاص بعذوى الكلاميديا بانتظام، حتى لو لم تظهر على الشخص أي أعراض، كما أن استخدام الواقي الذكري قد يساعد في الحد من انتقال الكلاميديا.

